

CITOL A+T ®**ANTAZOLINA +
TETRAHIDROZOLINA****Composición:**

Cada mL (30 gotas) contiene Antazolina fosfato 0,5 mg; Tetrahidrozolina HCl..... 0,4 mg; Excipientes: Ácido bórico; Cloruro de benzalconio al 10% y otros.

Mecanismo de acción:

Este producto es una asociación de 2 principios activos: la antazolina y la tetrahidrozolina.

La antazolina, que es un agente bloqueador de los receptores H1, que inhibe la acción de la histamina sobre la musculatura lisa de los vasos conjuntivales, siendo útil en las reacciones irritativas y alérgicas que cursan con edema, congestión y vasodilatación.

La tetrahidrozolina es un vasoconstrictor que hace desaparecer rápidamente los estados irritativos de la conjuntiva y proporciona un alivio subjetivo al paciente. La secreción lagrimal disminuye ligeramente mientras que el diámetro de la pupila, la acomodación y la tensión intraocular no experimentan ninguna influencia.

Farmacocinética:

Esta solución oftálmica se distribuye muy bien por los tejidos oculares, su absorción sistémica es escasa y no llega a valores clínicos significativos. Su acción, metabolización y eliminación se realizan principalmente a nivel ocular.

Indicaciones:

Afecciones alérgico-inflamatorias de la conjuntiva; especialmente conjuntivitis por fiebre del heno y conjuntivitis primaveral, además en casos de reacciones de hipersensibilidad medicamentosa, secreción lagrimal excesiva y estenosis del conducto lagrimal. Esta es una solución acuosa, elaborada bajo las máximas condiciones de asepsia para uso oftálmico, con un pH compatible con los tejidos oculares y con mínimas posibilidades de irritación.

Posología:

En la fase aguda se recomienda instilar en el saco conjuntival una gota cada 3 horas. Para su empleo permanente basta una gota 2 a 3 veces al día. En casos graves puede aplicarse hasta cada hora, sin que sean de temer efectos secundarios.

Modo de uso:

Se deben instilar las gotas en el ángulo interno del ojo, evitando en todo momento tocar el pico dosificador con superficies oculares o cualquier otra superficie, comprimir firmemente por 1 a 2 minutos sobre el ángulo lacrimonasal a fin de evitar el escurrimiento de lo instilado por el conducto lacrimonasal y secar el excedente, que quede sobre los párpados, con un pañuelo desechable.

Contraindicaciones:

Embarazo, lactantes e hiper-sensibilidad a la droga en personas muy sensibles, pueden aparecer signos de irritación como escozor ocular o nasal, sensación de cuerpo extraño en los ojos y lagrimeo. Por su escasa absorción no presenta efectos sistémicos.

Precauciones y advertencias:

Por contener Ácido bórico como excipiente, esta contra-indicado en niños menores de 3 años. Este medicamento, por contener cloruro de benzalconio como excipiente puede decolorar las lentes de contacto blandas. Cerrar el frasco inmediatamente después de usarlo. Limitar el uso a un mes después de la primera apertura del frasco. Se debe cuidar que el extremo del gotero no toque ninguna superficie. Debe controlarse el uso del producto en niños.

Restricciones de uso:

Se debe administrar con restricción en pacientes con lesiones oculares inflamatorias, adelgazamiento de la córnea y en aquellos que utilizan lentes de contacto permanentes.

Interacciones:

La aplicación conjunta de otros fármacos en forma de colirios puede producir interferencia en la acción de ambos. Por su escasa absorción sistémica carece de interacciones con drogas sistémicas.

Sobredosis:

Los casos de sobredosis son muy raros y se manifiestan sobre todo con síntomas locales como irritación, lagrimeo, escozor, dolor y edema de párpados. El tratamiento consiste en suspender el tratamiento y realizar lavado del ojo con solución fisiológica. En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en Emergencias Médicas sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel.: 220 418.

Presentación:

Caja conteniendo 1 frasco gotero de 10 mL.

**Almacenar a temperatura controlada
(15°C-25°C).
Mantener fuera del alcance de los niños.**



OFTALMICA

Elaborado por **Laboratorio de Productos ETICOS C.E.I.S.A.**
División Oftálmica. Atilio Galfre N° 151 y Calle 1 San Lorenzo, Paraguay
Tel.: (595-21) 521 390 (R.A.) Fax: (595-21) 521 389
laboratorio@eticos.com.py - www.eticos.com.py
D.T.: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes - Reg. N° 2837
Autorizado en Paraguay por el M.S.P. y B.S.