

VENTA BAJO
RECETA

 **GASTROCINETICO**

COMPRIADOS
VÍA ORAL

Digestic[®] Cinitaprida 1 mg

Composición:

Cada comprimido contiene:

Cinitaprida (como tartrato).....1,0 mg.
Excipientes.....c.s.

Mecanismo de acción:

La cinitaprida es una ortopramida con actividad procinética a nivel del tracto gastrointestinal que posee una marcada acción procolinérgica. Mediante el bloqueo de los receptores presinápticos para la serotonina, aumenta la liberación de la misma, resultando en una mayor actividad serotoninérgica. Su actividad antidopaminérgica, aunque discreta, contribuye al efecto terapéutico. Actúa estimulando el peristaltismo gastroesofágico y regulando la motilidad gastrointestinal. Al acelerar el vaciamiento gástrico desarrolla además un efecto antináusea y antiemético. Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior evitando el reflujo gastroesofágico y los trastornos funcionales del aparato digestivo.

Farmacocinética:

La farmacocinética de la cinitaprida muestra buena absorción oral y una biodisponibilidad de un 40 a 50%. Se alcanzan concentraciones plasmáticas máximas a las 2 horas de su administración. No pasa la barrera hematoencefálica y tiene escaso paso a la leche materna. Presenta alto metabolismo hepático por la enzima CYP3a y su excreción renal sin metabolizar es casi nula, con una vida media de 7 a 10 horas. En ancianos la vida media aumenta a 13 horas y en cirróticos a 18 horas.

Indicaciones:

Tratamiento del reflujo gastroesofágico y de los trastornos funcionales de la motilidad gastrointestinal (evacuación gástrica enlentecida). Dispepsia. Tratamiento del meteorismo y la aerogastria en estudios radiológicos o endoscópicos.

Posología:

Vía oral:

Adultos (mayores de 20 años): 1 comprimido, 3 veces al día, 15 minutos antes de cada comida. No es más eficaz ni conveniente aumentar la dosis recomendada.

No se aconseja la administración de cinitaprida en niños y adolescentes, por no disponer de experiencia de su uso en estos grupos de edades.

Contraindicaciones:

Pacientes en los que el estimular la motilidad gástrica puede resultar perjudicial (hemorragia digestiva, obstrucción, perforación, isquemia intestinal). Disquinesia tardía por neurolepticos. Evitar su uso hasta 3-4 días después de cirugía abdominal.

Feocromocitoma (puede desencadenar crisis hipertensivas). Alergia al fármaco. Embarazo y lactancia.

Reacciones adversas:

Se han señalado como reacciones adversas más frecuentes: somnolencia, astenia, alteraciones en las pruebas psicométricas, mareos, cefalea. Si se emplean dosis superiores a las terapéuticas se pueden presentar reacciones extrapiramidales y espasmos de la musculatura de cara y cuello que desaparecen al suspender el tratamiento.

En sujetos añosos sometidos a tratamientos prolongados pueden originarse discinesias tardías.

Precauciones y advertencias:

En ancianos sometidos a tratamientos prolongados, pueden originarse discinesias tardías. Durante el tratamiento con cinitaprida deben evitarse situaciones que requieran estados especiales de alerta como conducción de vehículos.

Restricciones de uso:

Este producto se debe administrar con restricción en pacientes ancianos o con antecedentes de

insuficiencia hepática y renal, úlcera péptica, diarrea crónica, porfiria, enfermedad de Parkinson, hipertensión arterial, depresión y alcoholismo.

Interacciones:

La estimulación del vaciado gástrico que produce cinitaprida puede alterar la absorción de algunos fármacos. El paciente debe indicar al médico si está en tratamientos con otros medicamentos.

Potencia los efectos de las fenotiacinas y otros antidopaminérgicos sobre el sistema nervioso central.

Puede disminuir el efecto de la digoxina mediante una reducción en su absorción.

Sus acciones sobre el tracto digestivo pueden reducirse por los anticolinérgicos atropínicos y los analgésicos narcóticos.

La administración concomitante con alcohol, tranquilizantes, hipnóticos o narcóticos potencia los efectos sedantes.

Inhibe el metabolismo de anticoagulantes orales (warfarina, neosyntron) y aumenta la velocidad de absorción de la morfina, el diazepam y los bloqueadores de receptores de histamina H2.

Sobredosis:

Por sobredosificación pueden aparecer somnolencia, desorientación y reacciones extrapiramidales que normalmente desaparecen al suspender el tratamiento. De persistir los síntomas se practicará lavado de estómago y medicación sintomática. Las reacciones extrapiramidales se controlan con la administración de anti-parkinsonianos, anticolinérgicos o antihistamínicos con propiedades anticolinérgicas. En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en Emergencias Médicas sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción, Paraguay, Tel.: 220 418.

Presentación:

Caja conteniendo 30 comprimidos.

**Almacenar a temperatura ambiente
(inferior a 30° C).**

Mantener fuera del alcance de los niños.



ETICOS[®]

Elaborado por

Laboratorio de Productos ETICOS C.E.I.S.A.
Atilio Galfre N° 151 y Calle 1- San Lorenzo, Paraguay
Tel.: (595-21) 521 390 (R.A.) Fax: (595-21) 521 389
laboratorio@eticos.com.py-www.eticos.com.py
D.T.: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes - Reg. N° 2837
Autorizado en Paraguay por el M.S.P. y B.S.