

VENTA LIBRE
EN FARMACIAS

COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS
VIA ORAL

Migranón Eva®

Ácido mefenámico 500 mg

Antidismenorreico - Analgésico - Antiinflamatorio

Para el tratamiento de la dismenorrea primaria y la menorragia.

Composición:

Cada comprimido recubierto contiene
Ácido mefenámico.....500,0 mg.
Excipientes.....c.s.

Mecanismo de acción:

El mecanismo de acción no se conoce, aunque estudios en animales indican que es capaz de inhibir la síntesis de prostaglandinas y de competir con ellas por la unión a sus receptores, produciendo así su efecto antiinflamatorio y analgésico.

Farmacocinética:

Su absorción es amplia (>90%) por el tracto gastrointestinal; su ligadura proteica es alta (>95%). Su vida media: 3-4 horas. No sufre metabolismo presistémico y se elimina por riñón.

Indicaciones:

Profilaxis y tratamiento de dismenorreas primarias y de las menorragias.

Posología:

1 comprimido 3 veces al día desde el comienzo de los síntomas hasta su total desaparición.

Modo de uso:

Ingerir los comprimidos con líquidos. La presencia de alimentos en el estómago no altera su biodisponibilidad.

Contraindicaciones:

Lesiones ulcerativas de la mucosa gástrica. No se

ha establecido su inocuidad durante el embarazo.

Reacciones adversas:

Los efectos secundarios son leves e infrecuentes: Diarrea ocasional, rash, somnolencia, náuseas, mareos y nerviosidad. En caso de diarrea se aconseja suspender la medicación. En casos aislados se ha observado leucopenia, al parecer no relacionada con la medicación.

Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Con menos frecuencia anorexia, pirois, flatulencia y constipación. Casos de anemia hemolítica autoinmune se han asociado con tratamientos prolongados (>1 año), lo mismo que un descenso del hematocrito (2% a 5%). Urticaria, erupciones, edema facial. Falla renal, incluso necrosis papilar que puede ser irreversible.

Precauciones y advertencias:

Administrar con precaución a pacientes con alteración de la función renal o en tratamiento con anticoagulantes. En caso de administración prolongada se aconseja efectuar recuentos globulares periódicos. La irritación gástrica no es frecuente, pero cuando ocurre puede evitarse o disminuirse ingiriendo el medicamento con los alimentos.

Restricciones de uso:

Este producto debe administrarse con restricción en pacientes con antecedentes de insuficiencia hepática y renal, úlcera gástrica, colitis ulcerativa o hemorragias gastrointestinales, discrasias sanguíneas, asma, congestión o secreción nasal, pólipos nasales, edema de las manos, pies, tobillos o piernas.

Interacciones:

De entre los AINE's el ácido mefenámico es el que posee menos interacciones con otras drogas y alimentos, pero como pertenece al grupo de AINE's se debe recordar:

El alcohol y los antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, pueden incrementar el riesgo de aparición de trastornos digestivos como pirois, acidez y úlceras.

Los anticoagulantes orales y las heparinas pueden incrementar el riesgo de sangrados.

Con las tabletas de Diazo-test, para determinar eliminación urinaria de biliis, pueden darse falsos

positivos. Con el test de Harrison no se observan interacciones.

Sobredosis:

En caso de sobredosis los síntomas serán digestivos, con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Para el tratamiento se recomienda la inducción del vómito o el lavado gástrico, seguidos de la administración de carbón activado y protectores de mucosa gástrica. En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en Emergencias Médicas, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel.: 220 418

Presentación:

Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

Almacenar a temperatura ambiente (inferior a 30°C), en lugar seco.

Mantener fuera del alcance de los niños.



ETICOS®

Elaborado por

Laboratorio de Productos ETICOS C.E.I.S.A.

Atilio Galfre N° 151 y Calle 1- San Lorenzo, Paraguay

Tel.: (595-21) 521 390 (R.A.) Fax: (595-21) 521 389

laboratorio@eticos.com.py-www.eticos.com.py

D.T.: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes - Reg. N° 2837

Autorizado en Paraguay por el M.S.P. y B.S.

316144-003

